

## مراقبت های بعد از تزریق بوتاکسین بوتولینوم

۱. تا ۴ ساعت بعد از تزریق بوتاکس از خوابیدن خودداری کنید.
۲. نواحی تزریق را دستکاری نکنید و ماساژ ندهید.
۳. از فعالیتهایی که سبب برافروختگی صورت شما می شوند (ورزش کردن، آفتاب گرفتن، حمام رفتن) خودداری کنید تا احتمال جابجایی ماده تزریق شده و خطر ایجاد عوارض جانبی به حداقل برسد.
۴. اگر محل تزریق دچار تورم شد و یا خونمردگی در این محل ایجاد شد برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از کیسه یخ در محل استفاده کنید و این کار را هر ۱ تا ۲ ساعت تکرار کنید تا مشکل برطرف شود.
۵. معمولاً ۲ تا ۳ روز بعد از تزریق بوتاکس فعالیت عضلات محل درمان کاهش پیدا می کند، اما حداکثر اثر درمان ۱ تا ۲ هفته بعد از تزریق قابل مشاهده است. بنابراین برای دیدن تاثیر درمان عجله نکنید! در ضمن ممکن است زمان تاثیر دارو در افراد مختلف متفاوت باشد.
۶. ۲ هفته بعد برای ارزیابی نتیجه تزریق و در صورت نیاز ترمیم به کلینیک مراجعه کنید.